




胆嚢炎を伴わない胆嚢結石症 腹腔鏡下胆嚢摘出術 パス日数:7日間

| | | 入院日(手術前日) | | 手術日 | | 手術後 | | | 退院日 | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|--|---|--------------|------------------------------|----------------|---|------------|---|---------|-------------------|---|-------------------|---|--------------|--|
| イベント | | 入院1日目 | | 手術日(術前) | | 手術日(術後) | | 手術後1日目 | 手術後2日目 | 手術後3日目 | 手術後4日目 | 手術後5日目 | | | | | |
| 日付 | | 月 日() | | 月 日() | | 月 日() | | 月 日() | 月 日() | 月 日() | 月 日() | 月 日() | | | | | |
| 患者目標 | | 手術について理解できる | | 手術前の心身の準備ができる | | 呼吸状態が安定している | | 肺炎の症状・所見がない | | 食事摂取ができる | | 発熱がない | | 痛みがない | | 創部に問題がない | |
| | | | | | | 体温・血圧・脈拍が安定している 創部に問題がない | | 腸閉塞の症状・所見がない 離床ができる | | | | | | | | | |
| | | | | | | 皮膚の状態に問題がない | |  | | 日常生活の注意点について理解できる | | ⇒ | | ⇒ | | 退院後の生活が理解できる | |
| 必要書類 | | <ul style="list-style-type: none"> ・入院診療計画書 ・検査等説明書 ・輸血療法・特定生物由来製品使用 ・静脈血栓塞栓症防止について説明があります。 同意書の提出をお願いします。 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 治療 | 内服 | 寝る前に下剤を飲みます センナリド錠 2錠 | | 起床時洗腸をします グリセリン洗腸 | | | | | | | | | | | | | |
| | 注射 | 夕方から点滴を行います | | 点滴を行います | | 点滴を行います | | 食事がとれれば点滴は終了となります | | | | | | | | | |
| | 処置 | 午後より麻酔科の受診があります 臍処置を行います | | | | 抗生剤の点滴があります 術後、創部の確認を行います | | 9時創部の確認を行います 心電図・呼吸モニタをはずします | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | |
| 検査 | | 採血があります | | | | 手術室でレントゲン撮影を行います | | レントゲン撮影があります | | | | 採血があります | | | | | |
| 食事 | 朝 | | | 欠食 | | 欠食 | | 五分粥 | | 常食B | | 常食B | | 常食B | | 常食B | |
| | 昼 | 常食B | | 欠食 | | 欠食 | | 七分粥 | | 常食B | | 常食B | | 常食B | | 欠食 | |
| | 夕 | 欠食 | | 欠食 | | 欠食 | | 全粥食 | | 常食B | | 常食B | | 常食B | | 欠食 | |
| 安静について | | 制限はありません | | | | ベッド上安静 | | 歩行可 | | 制限はありません | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | |
| 看護 | 検温 | 1日2回、体温・脈拍・血圧をみます | | 朝、体温・脈拍・血圧をみます | | 手術後4時間毎に体温・脈拍・血圧・呼吸状態をみます | | 1日4回、体温・脈拍・血圧・呼吸状態をみます | | 1日3回、体温・脈拍・血圧をみます | | 1日2回、体温・脈拍・血圧をみます | | ⇒ | | | |
| | 説明・清潔・排泄 | 術前オリエンテーションを行います | | | | | | スケジュールの確認を行います | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | | |
| | | 入院時オリエンテーションを行います | |  | | | | | | | | | | 退院後の生活に対する指導を行います | | ⇒ | |
| | | | | | | 疼痛緩和を行います | | 転倒に気をつけながら歩行の介助を行います | | | | | | | | | |
| | | | | | | 足に血栓予防の機械をつけます | | 足の血栓予防の機械をはずします | | | | | | | | | |
| | | | | | | 身体の向きを変え、褥瘡予防を行います。 | | 蓄尿の指導と管理を行います | | | | | | | | | |
| | 入浴を行います | | | | | | 身体拭き・陰部洗浄を行います | | シャワー浴を行います | | 入浴を行います | | ⇒ | | | | |
| 観察・計測 | 食事摂取量をみます | | | | | | 食事摂取量をみます | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | |
| | 尿回数・便回数をみます | | | | 便回数をみます | | 尿回数・便回数をみます | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | |
| | | | | | 尿量・尿比重を観察します | | ⇒ | | 蓄尿は中止になります | | ⇒ | | ⇒ | | | | |
| | | | | 痛みの状態を観察します | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | | | | |
| | | | | 吐気がないかみます | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | ⇒ | | | | | |