

イベント 日付	入院日		手術前日	手術前	入院4日目	入院4日目	入院5日目(術後1日目)	入院6日目(術後2日目)	入院7日目(術後3日目)	入院8日目(術後4日目)	退院日	
	入院1日目 月 日()	入院2日目 月 日()	入院3日目 月 日()	入院4日目 月 日()	入院4日目 月 日()	入院4日目 月 日()	入院5日目(術後1日目) 月 日()	入院6日目(術後2日目) 月 日()	入院7日目(術後3日目) 月 日()	入院8日目(術後4日目) 月 日()	入院9日目(術後5日目) 月 日()	
患者目標	手術(治療・検査)の目的が理解できる			手術(治療・検査)前の心身の準備ができる							合併症を起こさない【発熱、術後出血、水腎症】	
				バイタルサインが安定している	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
				発熱がない	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
				呼吸状態が安定している	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
				循環動態が安定している	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
				膀胱留置カテーテルの閉塞がない	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
				尿の性状に問題がない	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
				疼痛のコントロールができています	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
				TUR反応の症状・所見がない	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
				安静が守られている	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
治療	内服		眠前にセンナリド2錠(下剤)内服します									
	注射			点滴(側管)抗生剤を投与します	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	処置			点滴(メイン)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	リハビリ			継続的に膀胱内の洗浄を行います。	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒		
	検査	検体検査					採血があります					
	食事	朝食	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	
	栄養指導	昼食	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	
	安静について	夕食	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	
	看護	検温	1日1回、体温・脈拍・血圧H・血圧L・経皮的動脈酸素飽和度(SPO2)・体重(kg)・身長をみます	⇒	1日1回、体温・脈拍・血圧H・血圧L・経皮的動脈酸素飽和度(SPO2)をみます	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
		説明・清潔・排泄	術前オリエンテーションを行います									
入院時オリエンテーションを行います			⇒	⇒								
入浴を行います			⇒	⇒	術前にテレミンソフト座薬を挿肛し、排便後シャワー浴に入ります。					シャワー浴を行います	⇒	⇒
尿管留置を行います(手術室で留置行います)					尿管留置を行います(手術室で留置行います)	⇒	⇒	⇒	⇒			
血圧の予防【間欠的空気圧迫器】を行います					血圧の予防【間欠的空気圧迫器】を行います	⇒	⇒	⇒	⇒			
観察・計測		褥瘡の予防を行います。定期的に身体の向きを変えます。			褥瘡の予防を行います。定期的に身体の向きを変えます。	⇒	⇒	⇒	⇒			
		陰部洗浄を行います			陰部洗浄を行います	⇒	⇒	⇒	⇒			
		転倒防止ケアを行います			転倒防止ケアを行います	⇒	⇒	⇒	⇒			
		清拭を行います			清拭を行います	⇒	⇒	⇒	⇒			
	食事摂取量(主食)をみます	⇒	⇒				食事摂取量(主食)をみます	⇒	⇒	⇒	⇒	
食事摂取量(副食)をみます	⇒	⇒				食事摂取量(副食)をみます	⇒	⇒	⇒	⇒		
尿回数をみます	⇒	⇒						尿回数をみます	⇒	⇒		
便回数をみます	⇒	⇒				便回数をみます	⇒	⇒	⇒	⇒		
お知らせ	尿管留置カテーテル刺激症状をみます			尿管留置カテーテル刺激症状をみます	⇒	⇒	⇒	⇒				
	尿量(ml)をみます			尿量(ml)をみます	⇒	⇒	⇒	⇒				
	血尿(血尿スケール)をみます			血尿(血尿スケール)をみます	⇒	⇒	⇒	⇒				
	自尿をみます							自尿をみます				
										退院時オリエンテーションを行います。退院後、38℃以上の発熱や、濃い血尿があれば、連絡してください。水分をしっかりとってください。		

