

イベント 日付	入院日		手術前		手術後			退院日	
	入院1日目 月 日()	入院2日目 月 日()	入院2日目 月 日()	入院3日目(術後1日目) 月 日()	入院4日目(術後2日目) 月 日()	入院5日目(術後3日目) 月 日()	入院6日目(術後4日目) 月 日()	入院7日目(術後5日目) 月 日()	
患者目標	手術(治療・検査)前の心身の準備ができる		⇒						合併症を起こさない
	バイタルサインが安定している		⇒	発熱がない	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				呼吸状態が安定している	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				循環動態が安定している					
				膀胱留置カテーテルの閉塞がない	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				尿の性状に問題がない	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				疼痛のコントロールができています	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
				TUR反応の症状・所見がない	⇒				
				安静が守られている。術後はベット上安静です。					尿閉の症状・所見がない 排尿障害の症状・所見がない
				離床ができる。看護師と一緒に、歩行をおこなっていきます。					
			清潔の保持ができる	⇒	日常生活動作ができる				
					排尿コントロールについて理解できる	シャワー浴ができる	⇒		
						自然排尿ができる		自然排尿ができる	
			手術(治療・検査)の目的が理解できる						
			疼痛コントロールについて理解できる	疼痛コントロールについて理解できる					
			手術について理解できる						
			日常生活の注意点について理解できる					日常生活の注意点について理解できる 退院後の生活が理解できる。【水分摂取、アルコール、激しい運動を避ける。便秘を避ける】	
			麻酔について理解できる						
治療	内服	眠前にセンナリド錠12mg 2錠を内服します	術前朝テレミンソフト座薬を挿入します						
	注射			点滴(側管) 抗生剤を投与します	⇒				
検査	検体検査			点滴(メイン)	⇒				
	画像・生理・内視鏡			持続的に膀胱内の洗浄を行います	⇒				
食事	朝食		術前補水食	常食A	常食A	常食A	常食A	常食A	
	昼	常食A		欠食	常食A	常食A	常食A	常食A	
看護	検温	1日1回、体温・脈拍・血圧H・血圧L・経皮的動脈酸素飽和度(SPO2)・体重(kg)・身長をみます	1日1回、体温・脈拍・血圧H・血圧L・経皮的動脈酸素飽和度(SPO2)をみます	1日3回(帰室後、帰室1時間後、帰室3時間後) 体温・脈拍・血圧H・血圧L・経皮的動脈酸素飽和度(SPO2)をみます	1日1回、体温・脈拍・血圧H・血圧L・経皮的動脈酸素飽和度(SPO2)をみます	⇒	⇒	⇒	
	説明・清潔・排泄	術前オリエンテーションを行います 入院時オリエンテーションを行います 入浴を行います						入浴を行います 退院時オリエンテーション 退院後、38℃以上の発熱や、濃い血尿があれば、連絡してください。 水分をしっかりとってください。	
観察・計測			術前にテレミンソフト座薬を挿入し、排便後 シャワー浴に入ります	尿管留置を行います(手術室で留置します)	⇒		シャワー浴を行います	⇒	
				血栓の予防【間欠的空気圧迫器】を行います					
お知らせ				褥瘡の予防を行います。定期的に身体の向きを変えます。					
				陰部洗浄を行います 転倒防止ケアを行います 清拭を行います	⇒				
				食事摂取量(主食)をみます	⇒		⇒	⇒	
				食事摂取量(副食)をみます	⇒		⇒	⇒	
				尿回数をみます	⇒		尿回数をみます	⇒	
				便回数をみます	⇒		⇒	⇒	
				尿管留置カテーテル刺激症状をみます	⇒		⇒	⇒	
				血尿(血尿スケール)をみます	⇒		⇒	⇒	
							自尿をみます		

