1748非破裂性大動脈瘤　ステントグラフト術 パス日数:9 日間

		入院日	手術前	手術前日	手術当日		
イベント		入院1日目	入院2日目	入院3日目	手術前	手術後	手術後1日目
日付		月　日( )	月　日( )	月　日( )	月　日( )		月　日( )
患者目標				手術(治療・検査)の目的が理解できる	手術(治療・検査)前の心身の準備ができる	安全に計画通りに手術(治療・検査)ができる	手術(治療・検査)の結果を理解できる
		バイタルサインが安定している	⇒	⇒	⇒	⇒	
						創部に問題がない	
						創痛のコントロールができている	
						合併症の症状・所見がない	⇒
							疼痛のコントロールができている
						安静が守られている	
							リハビリの開始ができる
		入院生活について理解できる					
				手術について理解できる			
				精神的準備ができている			
必要書類		・転倒転落アセスメントスコア					・転倒転落アセスメントスコア
		・内服管理評価表					・内服管理評価表
		・入院診療計画書					
		・検査等説明書					
治療	内服			センナリド12mg　2錠 眠前に内服します	テレミンソフト坐薬10mg 術前に使用します		セフジニル「カプセル」100mg、ロキソプロフェン60mg、ファモチジン10mg 薬が開始します
	注射				術前から点滴を行います	点滴を投与します	
	処置					心電図・酸素モニターをつけます	
						酸素の吸入を行います	
	リハビリ						
検査	検体検査	採血があります					採血があります
	画像・生理	レントゲン、十二誘導検査、心臓超音波検査、呼吸機能検査、脈波伝播速度検査があります					レントゲンがあります
食事	朝		常食	常食	術前補水食(お茶や水は飲めません)		常食
	昼	常食	常食	常食	術前補水食		常食
	夕	常食	常食	常食		欠食	常食
栄養指導							
看護	安静について	安静制限はありません。病院内フリーです	⇒	⇒		ベッド上安静になります	安静制限はありません。病院内フリーです
	検温	1日2回、体温・脈拍・血圧・SPO2をみます	⇒	⇒		1日6回、体温・脈拍・血圧・SPO2をみます	1日3回、体温・脈拍・血圧・SPO2をみます
	説明・清潔・排泄	入院時オリエンテーションを行います		術前オリエンテーションを行います			
		入浴を行います	⇒	⇒			清拭を行います
				切毛を行います			
				準備物品の確認を行います			
							術後リハビリに関する教育を行います
							歩行が出来れば尿道留置カテーテルを抜きます
							点滴を抜針します
	観察・計測	副食摂取量をみます	⇒	⇒			副食摂取量をみます
		主食摂取量をみます	⇒	⇒			主食摂取量をみます
		尿回数をみます	⇒	⇒			尿回数をみます
		疼痛(有無)をみます	⇒	⇒		疼痛(有無)をみます	⇒
		胸部不快をみます	⇒	⇒		胸部不快をみます	⇒
		動脈触知(右足背動脈)をみます	⇒	⇒		動脈触知(右足背動脈)をみます	⇒
		動脈触知(左足背動脈)をみます	⇒	⇒		動脈触知(左足背動脈)をみます	⇒
						尿量をみます	⇒
						出血(創部)(有無)をみます	⇒
						血腫(有無)をみます	⇒
						発赤(有無)をみます	⇒
						創離開をみます	⇒
						腸蠕動音をみます	⇒
						排ガスをみます	⇒
							便回数をみます
							睡眠時間をみます

手術後			退院日
手術後2日目 月　日(　)	手術後3日目 月　日(　)	手術後4日目 月　日(　)	手術後5日目 月　日(　)
		退院後の生活が理解できる	
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒
リハビリができている	⇒		
		日常の注意点について理解できる	
⇒	⇒	⇒	⇒
		採血があります	
常食	常食	常食	常食
常食	常食	常食	
常食	常食	常食	
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	1日1回、体温・脈拍・血圧・SPO2をみます
シャワー浴を行います	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒		
		退院後の生活に対する指導を行います	
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒		
⇒	⇒		
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	⇒
⇒	⇒	⇒	