





イベント 日付	手術当日		術後							退院日 術後7日目 月 日( )		
	入院日・術前 入院日・術前 月 日( )	手術前 月 日( )	手術後	術後1日目 月 日( )	術後2日目 月 日( )	術後3日目 月 日( )	術後4日目 月 日( )	術後5日目 月 日( )	術後6日目 月 日( )			
患者目標	分娩開始徴候がない ⇒		安全に計画通りに手術(治療・検査)ができる								合併症を起こさない	
			バイタルサインが安定している ⇒ 子宮復古が正常である ⇒ 皮膚障害の症状・所見がない ⇒ 創痛のコントロールができていて疼痛のコントロールができています ⇒	⇒	⇒	⇒	子宮復古が正常である	保育の習得ができる	母乳栄養の確立ができる	⇒	⇒	
	治療について理解できる 創痛コントロールについて理解できる 日常生活の注意点について理解できる		創部に問題がない ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
			体位変換ができる	離床ができる								日常生活の注意点について理解できる
治療	内服			子宮の収縮を促進し出血を抑える内服が開始になります ・1日3回 朝・昼・夕食後 ・術後1日目に少量飲水で内服開始								
	注射		点滴を行います 痛み止めの注射があります 抗生剤の注射があります	点滴を行います 痛み止めの注射があります 抗生剤の注射があります								
	処置		硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入により痛みをコントロールします	硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入により痛みをコントロールします							創傷処置	
	処置	超音波検査ドップラー法(胎児心音観察)	心電図・呼吸モニタを行います	心電図・呼吸モニタを行います								
検査 食事	リハビリ 検体検査 画像・生理・内視鏡	採血があります		レントゲンがあります	採血があります						採血があります	
	朝食 朝食 朝食	手術の日は絶食です 飲水は指示に従ってください										
看護	検温	1日1回【体温・脈拍・血圧・身長・体重を測定します】	1日1回【体温・脈拍・血圧を測定します】	1日4回【体温・脈拍・血圧H・SPO2(酸素の値)を観察します】	1日4回【体温・脈拍・血圧を測定します】	1日3回【体温・脈拍・血圧を測定します】	1日2回【体温・脈拍・血圧を測定します】	1日1回【体温・脈拍・血圧・体重を測定します】	1日1回【体温・脈拍・血圧を測定します】	⇒	⇒	
	説明・清潔・排泄	術前オリエンテーションを行います 入院時オリエンテーションを行います おへそ掃除をしてシャワー浴を行います 【分娩監視装置】【ドップラー】を装着して陣痛の観察と胎児心音聴取を行います 持参された薬の確認・調整を行います ⇒	シャワー浴	尿管留置カテーテルの管理をします ⇒ 血栓予防【間欠的空気圧迫器】を装着します ⇒ 出生直後の新生児ケアを行います 必要に応じて食事を調整します	内服薬・外用薬の調整を行います ⇒			内服薬・外用薬の調整を行います ⇒				
	観察・計測	副食摂取量をみます ⇒ 主食摂取量をみます ⇒ 尿回数をもみます ⇒ 便回数をもみます ⇒		便回数をもみます ⇒ 輸液量をもみます ⇒ 尿量(ml)をもみます ⇒ 出血量を確認します ⇒ 子宮感長(産後)を確認します ⇒ 子宮硬度を確認します ⇒ 悪露の性状をみます ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	観察・計測			出血(創部)がないか確認します ⇒ 創周囲熱感(腹部)がないか確認します ⇒ 創周囲発赤(腹部)がないか確認します ⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
お知らせ	不安や不眠などがあれば医療者に伝えてください		痛みや出血など医療者に速やかに伝えてください	痛みや出血など医療者に速やかに伝えてください							退院へ向けて不安なことは医療者に伝え解決しましょう	